

بسمه تعالی

آزمون خودارزیابی

اگر تولید شیر گله شما در یک هفته ۱۰ درصد کاهش یابد، اولین اقدام شما چیست؟

(الف) افزایش فوری کنسانتره

(ب) بررسی مصرف ماده خشک، آب، تنش گرمایی و سلامت گله

(ج) تعویض نژاد گاوها

(د) کاهش تعداد وعده‌های خوراک

پاسخ صحیح: گزینه ب. پیش از هر تغییر در جیره، باید علت اصلی کاهش تولید مشخص شود

آیا کاهش تولید شیر همیشه به دلیل کمبود خوراک است؟

خیر. تنش گرمایی، کمبود آب، لنگش، بیماری‌های تحت‌بالینی، مدیریت شیردوشی و عدم تعادل جیره نیز از عوامل مهم هستند

در تابستان، اولین اقدامی که باید انجام داد چیست؟

اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تهویه، دسترسی دائم به آب خنک و برنامه‌ریزی خوراک‌دهی در ساعات خنک روز

هر گاو شیری روزانه به چه مقدار آب نیاز دارد؟

نیاز دقیق به وزن، دمای محیط و میزان تولید شیر بستگی دارد، اما گاوهای پرتولید معمولاً روزانه ده‌ها لیتر آب مصرف می‌کنند و در هوای گرم این مقدار به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. تأمین دائمی آب تمیز و خنک ضروری است.

هر چند وقت یک‌بار باید سم گاوها اصلاح شود؟

این موضوع به شرایط گله بستگی دارد، اما در بسیاری از گاوداری‌ها، برنامه منظم سم‌چینی پیشگیرانه به همراه معاینه دوره‌ای، نقش مهمی در کاهش لنگش دارد.

چگونه بفهمیم جیره نیاز به اصلاح دارد؟

کاهش تولید شیر، تغییر درصد چربی یا پروتئین شیر، افت نشخوار، تغییر قوام مدفوع و کاهش وضعیت بدنی از نشانه‌هایی هستند که باید جیره توسط متخصص بازبینی شود.